

Gender Issues in HIV/AIDS Epidemiology in Sub-Saharan Africa

Ben Wodi

Abstract

La nature patriarcale des sociétés africaines continue à déterminer le comportement sexuel des femmes de la région. Ceci à son tour explique la fréquence élevée de VIH/SIDA parmi les femmes de l'Afrique subsaharienne. Des plusieurs facteurs impliqués dans la fréquence inégale de la maladie parmi les femmes en Afrique, la dépendance économique/ la féminisation de la pauvreté, la distribution inégale du pouvoir sexuel (violence sexuelle et coercition) des opportunités éducatives limitées et le manque d'une volonté politique continuent dominer la littérature (Robinson, 2004; Dunkle, et al., 2004; Martin andCurtis, 2004; Eaton, et al., 2003; Mill andAnarfi, 2002).

Bien que les initiatives programmatiques et financières aient augmenté considérablement pendant la troisième décennie de l'épidémie, la communauté internationale doit faire plus pour renverser les tendances de l'épidémie en Afrique subsaharienne. Il faut que les leaders des pays subsahariens se résolvent à coordonner les programmes disponibles sur le VIH/SIDA pour que les individus affligés participent volontairement. Ceci implique l'éducation publique sur la santé qui est pertinent à la culture et qui prend en considération la question de genre sexuel.